

病名	レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
軟部腫瘍	ドキシソルピシン(ADR)	21	ドキシソルピシン	60	mg/m2	day1
	エリブリン	21	ハラヴェン	1.4	mg/m2	day1,8
	トラベクテジン	21	ヨンデリス	1.2	mg/m2	day1,2
	バゾバニブ		ヴォトリエント	1日1回 バゾバニブとして1回800mgを食事の1時間以上前または食後2時間以降に経口投与.患者の状態により適宜減量		連日
	パクリタキセル(PTX)	28	パクリタキセル	80	mg/m2	day1,8,15
原発不明癌	TC(パクリタキセル+カルボプラチン: PTX+CBDCA)	21	パクリタキセル	175	mg/m2	day1 max6サイクル
			カルボプラチン	AUC5-6		day1
	オブジーボ(2週間毎)(ニボルマブ: Nivo)	14	オブジーボ	240	mg/body	day1
	オブジーボ(4週間毎)(ニボルマブ: Nivo)	28	オブジーボ	480	mg/body	day1
MSI-High固形癌	キイトルーダ(3週間毎)(ペムプロリズマブ: Pemb)	21	キイトルーダ	200	mg/body	day1
	キイトルーダ(6週間毎)(ペムプロリズマブ: Pemb)	42	キイトルーダ	400	mg/body	day1
	オブジーボ(2週間毎)(ニボルマブ: Nivo)	14	オブジーボ	240	mg/body	day1
	オブジーボ(4週間毎)(ニボルマブ: Nivo)	28	オブジーボ	480	mg/body	day1
	キイトルーダ(3週間毎)(ペムプロリズマブ: Pemb)	21	キイトルーダ	200	mg/body	day1
TMB-High 固形癌	キイトルーダ(6週間毎)(ペムプロリズマブ: Pemb)	42	キイトルーダ	400	mg/body	day1
骨転移	ゾレドロン酸	21~28	ゾレドロン酸	ゾレドロン酸として4mg/body CCr>60:4mg, CCr50-60:3.5mg, CCr40-49:3.3mg, CCr30-39:3mg		day1
	ランマーク(デノスマブ)	28	ランマーク	デノスマブとして120mg/body		day1