

| 病名 | レジメン名称 | 1サイクル(日) | 薬品名 | 投与量 | 投与日 | 備考 |
|------------|---------------------|----------|---------|--|-------|-----------|
| 消化器 (NEC) | エトボシド+カルボプラチン (NEC) | 28 | エトボシド | 80-100 | mg/m2 | day1-3 |
| | (ETP+CBDCA) | | カルボプラチン | AUC5 | | day1 |
| 消化器 (NEC) | イリノテカン+シスプラチン(NEC) | 28 | イリノテカン | 60 | mg/m2 | day1,8,15 |
| | (CPT-11+CDDP) | | シスプラチン | 60 | mg/m2 | day1 |
| 消化器 (NEC) | ドセタキセル+シスプラチン(NEC) | 28 | ドセタキセル | 60 | mg/m2 | day1 |
| | (DOC+CDDP) | | シスプラチン | 80 | mg/m2 | day1 |
| 消化器 (NEC) | エトボシド+シスプラチン(NEC) | 28 | エトボシド | 100 | mg/m2 | day1,2,3 |
| | (ETP+CDDP) | | シスプラチン | 80 | mg/m2 | day1 |
| 消化器 (NEC) | アムルピシン(3日連続投与) | 21-28 | カルセド | 45 | mg/m2 | day1,2,3 |
| 消化器 (GIST) | アフィニトール(エベロリムス) | | アフィニトール | 1日1回 エベロリムスとして1回10mgを経口投与.患者の状態により適宜減量. | | 連日 |
| 消化器 (GIST) | イマチニブ | | イマチニブ | 1日1回 イマチニブとして1回400mgを食後に経口投与.年齢・症状により適宜減量. | | 連日 |
| 消化器 (GIST) | スニチニブ | 42 | スニチニブ | 1日1回 スニチニブとして1回50mgを4週間経口投与,その後2週間休薬.患者の状態により適宜減量 | | day1-28 |
| 消化器 (GIST) | レゴラフェニブ | 28 | スチバーガ | 1日1回 レゴラフェニブとして1回160mgを食後に3週間経口投与し,その後1週間休薬.患者の状態により適宜減量 | | day1-21 |