

病名	レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考	
胚細胞性腫瘍	BEP (プレオマイシン+エトポシド+シスプラチン : BLM+ETP+CDDP)	21	プレオ	20mg/m ² or 30mg/body	day2,9,16	max3-4サイクル	
			エトポシド	100	mg/m ²		day1-5
			シスプラチン	20	mg/m ²		day1-5
子宮平滑筋肉腫	ゲムシタビン+ドセタキセル(GEM+DXT)	21-28	ゲムシタビン	1,000	mg/m ²	day1,8	
			ドセタキセル	70	mg/m ²	day8	
子宮平滑筋肉腫	ドキソルピシン75mg/m ² (ADR)	21	ドキソルピシン	75	mg/m ²	day1	max6サイクル
子宮平滑筋肉腫	ドキソルピシン20mg/m ² (ADR)	28	ドキソルピシン	20	mg/m ²	day1-3	
軟部腫瘍	ヨンデリス(トラベクテジン)	21	ヨンデリス	1.2	mg/m ²	day1	
絨毛性腫瘍	メソトレキセート+コスメゲン(MA)	28	メソトレキセート	0.4	mg/kg	day1-4	
	メソトレキセート+アクチノマイシンD : MTX+ACT-D)		コスメゲン	10	mcg/kg	day1-4	
絨毛性疾患	MEA (メソトレキセート+エトポシド+コスメゲン : MTX+ETP+ACT-D)	28	メソトレキセート	300	mg/body	day1	
			エトポシド	100	mg/body	day1-6	
			コスメゲン	0.5	mg/body	day1-6	
絨毛性腫瘍	メソトレキセート(メソトレキセート : MTX)	14	メソトレキセート	0.4mg/kg or 20~30mg/body	day1-5		
絨毛性疾患	メソトレキセート 50mg/m ² (メソトレキセート : MTX)	7	メソトレキセート	50	mg/m ²	day1	