

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
S-1	42	S-1	1日2回28日間連日経口投与し,その後14日間休薬.患者の状態により適宜増減.(1日80mg/m ²)	day1-28	
CF (シスプラチン+フルオロウラシル: CDDP+5FU)	21	シスプラチン フルオロウラシル	80 800	mg/m ² mg/m ²	day1 day2-6
TPF (ドセタキセル+シスプラチン+フルオロウラシル) : DTX+CDDP+5FU)	21	ドセタキセル シスプラチン フルオロウラシル	60 75 750	mg/m ² mg/m ² mg/m ²	day1 day1 day2-6
シスプラチン+放射線 (CDDP+RT)	21	シスプラチン 放射線照射	80 2	mg/m ² Gy/body	day1 5day/week
カルボプラチン+放射線 (CBDCA+RT)	7	カルボプラチン 放射線照射	AUC2		day1 max7サイクル
バクリタキセル(PTX)	49	バクリタキセル	100	mg/m ²	day1,8,15,22,29,36 6投1休
アービタックス(1週間毎)(セツキシマブ: Cet)	7	アービタックス	初回400mg/m ² , 2回目以降250mg/m ²		day1
アービタックス(2週間毎)(セツキシマブ: Cet)	14	アービタックス	500	mg/m ²	day1
PCE(Cet+PTX+CBDCA)	21	アービタックス	初回400mg/m ² , 2回目以降250mg/m ²		day1,8,15
アービタックス+バクリタキセル+カルボプラチン (セツキシマブ+バクリタキセル+カルボプラチン)		バクリタキセル カルボプラチン	80~100 AUC2	mg/m ²	day1,8 day1,8 再発転移PTX80mg/m ² ,
アービタックス+バクリタキセル (セツキシマブ+バクリタキセル: Cet+PTX)	49	アービタックス バクリタキセル	初回400mg/m ² , 2回目以降250mg/m ² 80		day1,8,15,22,29,36,43 day1,8,15,22,29,36 6投1休
アービタックス+CF (セツキシマブ+シスプラチン+フルオロウラシル : Cet+CDDP+5FU)	21	アービタックス シスプラチン フルオロウラシル	初回400mg/m ² , 2回目以降 250mg/m ² 80 800		day1,8,15 day1 day1-5
アービタックス+カルボプラチン+フルオロウラシル (セツキシマブ+カルボプラチン+フルオロウラシル) : Cet+CBDCA+5FU)	21	アービタックス カルボプラチン フルオロウラシル	初回400mg/m ² , 2回目以降250mg/m ² AUC5 800		day1,8,15 day1 day1-5
アービタックス+カルボプラチン (セツキシマブ+カルボプラチン: Cet+CBDCA)	21	アービタックス カルボプラチン	初回400mg/m ² , 2回目以降250mg/m ² AUC5		day1,8,15 day1
アービタックス+放射線 (セツキシマブ+RT: Cet+RT)	7	アービタックス 放射線照射	初回400mg/m ² , 2回目以降250mg/m ² 1.8~2.0		day1 Gy/fr 総線量70Gy, アービタックス2回目から開始
セツキシマブ サロタロカンナトリウム+レーザ光 (アルミノックス療法)	28	アキラルックス レーザ光	640	mg/m ²	day1 day2 max4サイクル アキラルックス投与20-28hr後に照射
オブジーボ(2週間毎)(ニボルマブ: Nivo)	14	オブジーボ	240	mg/body	day1
オブジーボ(4週間毎)(ニボルマブ: Nivo)	28	オブジーボ	480	mg/body	day1
キイトルーダ(ペムブロリズマブ: Pemb)	21	キイトルーダ	200	mg/body	day1
キイトルーダ+CF (ペムブロリズマブ+シスプラチン+フルオロウラシル : Pemb+5FU+CDDP)	21	キイトルーダ シスプラチン フルオロウラシル	200 80 1,000	mg/body mg/m ² mg/m ²	day1 day1 day1-5
キイトルーダ+CBDCA+5FU (ペムブロリズマブ+カルボプラチン+フルオロウラシル : Pemb+CBDCA+5FU)	21	キイトルーダ カルボプラチン フルオロウラシル	200 AUC5 1,000	mg/body mg/m ²	day1 day1 day1-4 max6サイクル
ネクサバル(ソラフェニブ)		ネクサバル	1日2回 ソラフェニブとして1回400mg経口投与. 患者の状態により適宜減量		連日
レンビマ(レンバチニブ)		レンビマ	1日1回 レンバチニブとして1日1回24mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量		連日