

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
アフィニートル(エベロリムス)		エベロリムス	1日1回エベロリムスとして10mgを経口投与.患者の状態により適宜減量.	連日	
イムネース(テセロイキン)		イムネース	70	万単位/body day1	1週間に2回投与
テムシロリムス	7	トーリセル	25	mg/body day1	
アキシチニブ		インライタ	1日2回アキシチニブとして1回5mg経口投与.患者の状態により適宜増減するが, 1回10mg1日2回まで増量できる	連日	
スニチニブ	42	スニチニブ	1日1回スニチニブとして1回50mgを4週間連日経口投与し,その後2週間休業.患 者の状態により適宜減量	day1-28	
ソラフェニブ		ソラフェニブ	1日2回ソラフェニブとして1回400mg経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
バゾパニブ		ヴォトリエント	1日1回バゾパニブとして1回800mgを経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
カボザンチニブ		カボメティクス	1日1回カボザンチニブとして1回60mgを経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
オブジーボ+ヤーボイ (ニボルマブ+イピリムマブ:Nivo+Ipi)	21	オブジーボ	240	mg/body day1	max4サイクル→オブジーボ単剤療法へ
		ヤーボイ	1	mg/kg day1	
オブジーボ(2週間毎)(ニボルマブ:Nivo)	14	オブジーボ	240	mg/body day1	オブジーボ+ヤーボイ併用療法4サイクル後
オブジーボ(4週間毎)(ニボルマブ:Nivo)	28	オブジーボ	480	mg/body day1	オブジーボ+ヤーボイ併用療法4サイクル後
オブジーボ(2週間毎)+カボメティクス (ニボルマブ(Nivo)+カボザンチニブ)	14	オブジーボ	240	mg/body day1	
		カボメティクス	1日1回 カボザンチニブとして1回40mgを空腹時に経口投与.患者の状態により 適宜減量	連日	
オブジーボ(4週間毎)+カボメティクス (ニボルマブ(Nivo)+カボザンチニブ)	28	オブジーボ	480	mg/body day1	
		カボメティクス	1日1回 カボザンチニブとして1回40mgを空腹時に経口投与.患者の状態により 適宜減量	連日	
バベンチオ+インライタ (アベルマブ+アキシチニブ)	14	バベンチオ	10	mg/kg day1	
		インライタ	1日2回 アキシチニブとして1回5mg経口投与.患者の状態により適宜増減するが, 1回10mg1日2回まで増量できる	連日	
キイトルーダ(3週間毎)+インライタ (ベムプロリズマブ(Pemb)+アキシチニブ)	21	キイトルーダ	200	mg/body day1	
		インライタ	1日2回 アキシチニブとして1回5mg経口投与.患者の状態により適宜増減するが, 1回10mg1日2回まで増量できる	連日	
キイトルーダ(6週間毎)+インライタ (ベムプロリズマブ(Pemb)+アキシチニブ)	42	キイトルーダ	400	mg/body day1	
		インライタ	1日2回 アキシチニブとして1回5mg経口投与.患者の状態により適宜増減するが, 1回10mg1日2回まで増量できる	連日	
キイトルーダ(3週間毎)+レンピマ (ベムプロリズマブ+レンパチニブ:Pemb+Len)	21	キイトルーダ	200	mg/body day1	
		レンピマ	1日1回 レンパチニブとして20mgを経口投与.患者の状態により適宜減量.	連日	
キイトルーダ(6週間毎)+レンピマ (ベムプロリズマブ+レンパチニブ:Pemb+Len)	42	キイトルーダ	400	mg/body day1	
		レンピマ	1日1回 レンパチニブとして20mgを経口投与.患者の状態により適宜減量.	連日	
キイトルーダ(3週間毎)腎癌術後補助(ベムプロリズマブ:Pemb)	21	キイトルーダ	200	mg/body day1	max12ヶ月
キイトルーダ(6週間毎)腎癌術後補助(ベムプロリズマブ:Pemb)	42	キイトルーダ	400	mg/body day1	max12ヶ月
ベルズチファン		ウェリレグ	1日1回 ベルズチファンとして1回120mgを経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	