

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考	
ゲムシタピン(GEM)	28	ゲムシタピン	1,000	mg/m2	day1,8,15	
M-VAC	28	メソトレキセート	30	mg/m2	day1,15,22	
(メソトレキセート+ビンブラステチン+ドキソルピシン+シスプラチン : MTX+VLB+ADR+CDDP)		エクザール	3	mg/m2	day2,15,22	
		ドキソルピシン	30	mg/m2	day2	
		シスプラチン	70	mg/m2	day2	
GC(4週間毎)	28	ゲムシタピン	1,000	mg/m2	day1,8,15	
(ゲムシタピン+シスプラチン : GEM+CDDP)		シスプラチン	70	mg/m2	day2	
GC(3週間毎)	21	ゲムシタピン	1,000	mg/m2	day1,8	
(ゲムシタピン+シスプラチン : GEM+CDDP)		シスプラチン	70	mg/m2	day2	
ゲムシタピン+カルボプラチン(GEM+CBDCA)	28	ゲムシタピン	1,000	mg/m2	day1,8,15	
		カルボプラチン	AUC5		day1	
GN	28	ゲムシタピン	1,000	mg/m2	day1,8,15	
(ゲムシタピン+ネダブラチン : GEM+NDP)		アクブラ	100	mg/m2	day2	
TIN	21	バクリタキセル	175	mg/m2	day1	
(バクリタキセル+イホスファミド+ネダブラチン : PTX+IFM+NDP)		イホマイド	1,500	mg/m2	day1-3	
		アクブラ	100	mg/m2	day1	
TN	21	バクリタキセル	210	mg/m2	day1	
(バクリタキセル+ネダブラチン : PTX+NDP)		アクブラ	100	mg/m2	day2	
選択的動注化学療法(±放射線外照射療法)(腎不全)	28	ドキソルピシン	30	mg/body	day1	
(ドキソルピシン+シスプラチン : ADR+CDDP)		シスプラチン	60	mg/body	day1	
		±放射線照射				
選択的動注化学療法(±放射線外照射療法)(腎不全)	28	ドキソルピシン	30	mg/body	day1	
(ドキソルピシン+カルボプラチン : ADR+CBDCA)		カルボプラチン	AUC4.5		day1	
		±放射線照射				
バドセブ(エンホルツマブ ベドチン)	28	バドセブ	1.25	mg/kg	day1,8,15	max 125mg/body/回
バベンチオ維持療法(アベルマブ)	14	バベンチオ	10	mg/kg	day1	
オブジーボ (2週間毎)尿路上皮癌術後補助(ニボルマブ : Nivo)	14	オブジーボ	240	mg/body	day1	max 12ヶ月間まで
オブジーボ (4週間毎)尿路上皮癌術後補助(ニボルマブ : Nivo)	28	オブジーボ	480	mg/body	day1	max 12ヶ月間まで
オブジーボ (4週間毎2年間)(ニボルマブ : Nivo)	28	オブジーボ	480	mg/body	day1	max2年間
Nivo+GC	21	オブジーボ	360	mg/body	day1	max6サイクル
(ニボルマブ+ゲムシタピン+シスプラチン : Nivo+GEM+CDDP)		ゲムシタピン	1,000	mg/m2	day1,8	
		シスプラチン	70	mg/m2	day1	
Nivo+Gcarbo		オブジーボ	360	mg/body	day1	max6サイクル
(ニボルマブ+ゲムシタピン+カルボプラチン : Nivo+GEM+CBDCA)		ゲムシタピン	1,000	mg/m2	day1,8	
		カルボプラチン	AUC5		day1	
キイトルーダ(3週間毎)(ペムプロリズマブ : Pemb)	21	キイトルーダ	200	mg/body	day1	
キイトルーダ(6週間毎)(ペムプロリズマブ : Pemb)	42	キイトルーダ	400	mg/body	day1	
キイトルーダ+バドセブ	21	キイトルーダ	200	mg/body	day1	
(ペムプロリズマブ+エンホルツマブ ベドチン)		バドセブ	1.25	mg/kg	day1,8	
術前Durv+GC	21	イミフィンジ	1,500	mg/body	day1	max4サイクル
(デュルバルマブ+ゲムシタピン+シスプラチン)		ゲムシタピン	1,000	mg/m2	day1,8	
		シスプラチン	70	mg/m2	day1	

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考	
術後Durv維持(デュルバルマブ)	28	イミフィンジ	1,500	mg/body	day1	max8サイクル
エルダフィチニブ		バルバーサ	1日1回	エルダフィチニブとして1回8mgを2週間経口投与し、それ以降は1回9mgを経口投与		連日