

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
ドセタキセル(DOC or DTX)	21	ドセタキセル	75	mg/m2 day1	
ドセタキセル(DOC or DTX)	28	ドセタキセル	75	mg/m2 day1	
ジェブタナ(カバジタキセル：CBZ or CTX)	21	ジェブタナ	25	mg/m2 day1	プレドニン10mg/dayと併用
エストラサイト(エストラムステン：EP or EMP)		エストラサイト	1日2回 エストラムステリン酸エステルナトリウム水和物として1回313.4mgを経口投与. 症状により適宜増減.	連日	
ターゼナ (タラゾバリブ)		ターゼナ	1日1回 タラゾバリブとして1回0.5mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	エンザルタミドと併用
オダイン(フルタミド：FLU)		オダイン	1日3回 フルタミドとして1回125mgを食後に経口投与. 症状により適宜増減.	連日	
ピカルタミド (カソデックス:BCT)		ピカルタミド	1日1回 ピカルタミドとして1回80mgを経口投与.	連日	
プロスターール(クロルマジン：CMA)		プロスターール	1日2回 クロルマジノン酢酸エステルとして1回50mgを食後に経口投与.	連日	
イクスタンジ(エンザルタミド：ENZ)		イクスタンジ	1日1回 エンザルタミドとして1回160mgを経口投与.	連日	
ザイティガ(アピラテロン：ABI)		ザイティガ	1日1回 アピラテロン酢酸エステルとして1,000mgを空腹時に経口投与.(プレドニゾンと併用)	連日	
アーリーダ(アバルタミド：APA)		アーリーダ	1日1回 アバルタミドとして1回240mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量.	連日	
ニューベクオ(ダロルタミド：DAR)		ニューベクオ	1日2回 ダロルタミドとして1回600mgを経口投与.患者の状態により適宜減量.	連日	
リムバーザ(オラバリブ)		リムバーザ	1日2回 オラバリブとして1回300mg経口投与.患者の状態により適宜減量.(他の薬剤と併用する場合は,アピラテロン酢酸エステルおよびプレドニゾンと併用)	連日	
リュープロレリン(LEU)	28(=4weeks)	リュープロレリン	リュープロレリンとして3.75mg/body	day1	
	84(=12weeks)	リュープロレリンSR	リュープロレリンとして11.25mg/body	day1	
	168(=24weeks)	リュープリンPRO	リュープロレリンとして22.5mg/body	day1	
ゾラデックス(ゴセレリン：ZOL)	28(=4weeks)	ゾラデックス3.6mg	ゴセレリンとして3.6mg/body	day1	
	84(=12weeks)	ゾラデックスLA	ゴセレリンとして10.8mg/body	day1	
ゴナックス(デガレリクス)	28	ゴナックス120mg(初回用)	デガレリクスとして初回240mg(1カ所あたり120mgずつ腹部2カ所)	day1	初回のみ
	28(=4weeks)	ゴナックス80mg(維持用)	2回目以降, デガレリクスとして80mg(1カ所)	day1	
	84(=12weeks)	ゴナックス480mg(維持用)	2回目以降, デガレリクスとして480mg(1カ所あたり240mgずつ腹部2カ所)	day1	