

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
オブジーボ(2週間毎)(ニボルマブ：Nivo)	14	オブジーボ	240	mg/body day1	
オブジーボ(4週間毎)(ニボルマブ：Nivo)	28	オブジーボ	480	mg/body day1	
オブジーボ+ヤーボイ (ニボルマブ+イピリムマブ：Nivo+Ipi)	21	オブジーボ	80	mg/body day1	4サイクル後、オブジーボ単剤
		ヤーボイ	3	mg/kg day1	
キイトルーダ(3週間毎)(ペムプロリズマブ：Pemb)	21	キイトルーダ	200	mg/body day1	
キイトルーダ(6週間毎)(ペムプロリズマブ：Pemb)	42	キイトルーダ	400	mg/body day1	
ダブラフェニブ+トラメチニブ		タフィンラー	1日2回 ダブラフェニブとして1回150mgを空腹時に経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
		メキニスト	1日1回 トラメチニブとして1回2mgを空腹時に経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
エンコラフェニブ+ピニメチニブ		ピラフトビ	1日1回 エンコラフェニブとして1回450mgを経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
		メクトビ	1日2回 ピニメチニブとして1回45mgを経口投与.患者の状態により適宜減量	連日	
ベムラフェニブ		ゼルボラフ	1日2回 ベムラフェニブとして1回960mgを経口投与	連日	
Low-doseFP療法	28	フルオロウラシル	500	mg/m2 day1-5	
(フルオロウラシル+シスプラチン：5FU+CDDP)		シスプラチン	5	mg/m2 day1-5	
パクリタキセル(PTX)	28	パクリタキセル	80	mg/m2 day1,8,15	血管肉腫