

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
イマチニブ		イマチニブ	1日1回 イマチニブとして400mgを食後に経口投与. 血液所見, 年齢・症状により適宜増減するが, 1日1回600mgまで増量できる	連日	
イマチニブ		イマチニブ	1日1回 イマチニブとして600mgを食後に経口投与. 血液所見, 年齢・症状により適宜増減するが, 1日800mg(400mgを1日2回)まで増量でき	連日	
ニロチニブ		タシグナ	成人: 1日2回 ニロチニブとして1回400mgを食事の1時間以上前または食後2時間以降に12時間毎を目安に経口投与. ただし初発の慢性期のCMLは1回300mg. 患者の状態により適宜減量 小児: 1日2回 ニロチニブとして1回約230mg/m ² を食事の1時間以上前又は食後2時間以降に12時間毎を目安に経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	
ダサチニブ		スプリセル	1日1回 ダサチニブとして100mgを経口投与. 患者の状態により適宜増減. 1日1回140mgまで増量できる	連日	
ダサチニブ		スプリセル	1日2回 ダサチニブとして70mgを経口投与. 患者の状態により適宜増減. 1日1回90mgまで増量できる	連日	
ボスチニブ		ボシュリフ	1日1回 ボスチニブとして500mgを経口投与. 初発の慢性期のCMLの場合は1回400mgとする. 患者の状態により適宜増減. 1日1回600mgまで増量できる	連日	
ボナチニブ		アイクルシグ	1日1回 ボナチニブとして45mgを1日1回経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	
アシミニブ		セムブリックス	1日1回 アイミニブとして1回80mgを空腹時に経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	
ピルトブルチニブ		ジャイパーカ	1日1回 ピルトブルチニブとして200mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量.	連日	