

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考			
m-LSG15(VCAP-AMP-VECP)	28	オンコピン	1	mg/m2	day1	max 2mg/body		
		エンドキサン	350	mg/m2	day1			
		ドキシソルピシン	40	mg/m2	day1			
		プレドニン	40	mg/m2	day1			
		ドキシソルピシン	30	mg/m2	day8			
		サイメリン	60	mg/m2	day8			
		プレドニン	40	mg/m2	day8			
		フィルデシン	2.4	mg/m2	day15			
		エトボシド	100	mg/m2	day15-17			
		カルボプラチン	250	mg/m2	day15			
		プレドニン	40	mg/m2	day15-17			
				随注	MTX:15mg/body, AraC:40mg/body, PSL10mg/body		2.4.6サイクル目の前に	
		Moga-CHOP-14	14	ポテリジオ	1		mg/kg	day1
(モガリズマブ+シクロホスファミド+		エンドキサン	750	mg/m2	day1			
(ドキシソルピシン+ピンクリスチン+プレドニゾン		オンコピン	1.4	mg/m2	day1	max2mg/m2		
: CPA+ADR+VCR+PSL)		ドキシソルピシン	50	mg/m2	day1			
		プレドニン	40	mg/m2	day1-5			
モガリズマブ(Moga)	7	ポテリジオ	1	mg/kg	day1	max 8サイクル		
レナリドミド		レブラミド	1日1回 レナリドミドとして25mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量		mg/body	連日		
ツシジノスタット		ハイヤスタ	1日1回 ツシジノスタットとして40mgを週2回(3または4日間隔)食後に経口投与. 患者の状態により適宜減量			週2回(3または4日間隔)		
バレメトスタット		エザルミア	1日1回 バレメトスタットとして200mgを空腹時に経口投与. 患者の状態により適宜減量			連日		