

レジメン名称	1サイクル(日)	薬品名	投与量	投与日	備考
フルダラビン(Flu)	28	フルダラ	20	mg/m2	day1-5
アカラブルチニブ+オビヌツズマブ(1サイクル目)	28	カルケンス	1日2回 アカラブルチニブとして100mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	1サイクル目はアカラブルチニブのみ
アカラブルチニブ+オビヌツズマブ (2サイクル目)	28	カルケンス	1日2回 アカラブルチニブとして100mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	オビヌツズマブはmax6サイクル
		ガザイバ	100	mg/body	day1
		ガザイバ	900	mg/body	day2
		ガザイバ	1,000	mg/body	day8,15
アカラブルチニブ+オビヌツズマブ (3-7サイクル目)	28	カルケンス	1日2回 アカラブルチニブとして100mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	
		ガザイバ	1,000	mg/body	day1
イブルチニブ		イムブルピカ	1日1回 イブルチニブとして420mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	
ザヌブルチニブ		ブルキンザ	1日2回 ザヌブルチニブとして1回160mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	
ベネトクラクス+リツキシマブ(VEN+RIT)	28	ベネクレクスタ	1日1回 ベネトクラクスとして、用量漸増期は第1週目20mg, 第2週目50mg, 第3週目100mg, 第4週目200mg, 第5週目400mgを7日間食後に経口投与. その後の維持投与期は、400mgを食後に経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	VEN : max2年
		リツキシマブ	1サイクル目375mg/m2, 2サイクル目以降500mg/m2	day1	RIT : max6サイクル
FCR	28	リツキシマブ	1サイクル目375mg/m2, 2サイクル目以降500mg/m2	day1	1サイクル目はRit day0
(フルダラビン+シクロホスファミド+ リツキシマブ : Flu+CPA+Rit)		フルダラ	25	mg/m2	day1-3
		エンドキサン	250	mg/m2	day1-3
ベンダムスチン(Bend)	28	トレアキシシ	100	mg/m2	day1,2
BR(ベンダムスチン+リツキシマブ)	28	トレアキシシ	100	mg/m2	day1,2
		リツキサン	375	mg/m2	day1
					RIT : max6サイクル
アレムツズマブ		マブキャンパス	1日1回3mg連日点滴静注から開始し, 1日1回10mgを連日点滴静注した後, 1日1回30mgを週3回隔日に点滴静注.		max12週間
ビルトブルチニブ		ジャイバーカ	1日1回 ビルトブルチニブとして200mgを経口投与. 患者の状態により適宜減量	連日	