


























説明看護師(外来)

様へ


看護師(病棟)

| 月日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
|---|--|--|--|
| 経過 | 入院日(治療前日) | | 治療 1 日目 |
| 目標 | ○心身共に安定した状態で治療を迎えることができる ○治療の流れや注意点が理解できる | | ○副作用症状が最小限度で経過する ○感染、出血予防行動、貧血時の注意行動ができる ○治療の流れや注意点が理解できる |
| 検査 |  ・身長、体重測定  ・適宜、血液検査、尿検査、心電図、胸部レントゲン実施 | |  適宜 血液検査 |
| 食事 | 朝食は自宅で |   |       |
| 処置・観察 | 入院時リストバンドを装着します(退院日まで装着します) | | 点滴前に留置針を挿入します 点滴が終了しても針は残しておきます (PICC 挿入されている方は、PICC から点滴します) |
|  状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります | | | |
| 点滴・内服 |  持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください |  点滴前に内服薬があります 以下の点滴を行います(約 6 時間半) 1) 制吐剤 2) 生理食塩液 3) ポライビー 4) 生理食塩液 5) 生理食塩液 (4 と同時滴下) 6) ドキソルビシン (4 と同時滴下) 7) 生理食塩液 (4 と同時滴下) 8) エンドキサン 9) 点滴を 1 本 10) リツキシマブ 11) 生理食塩液 ※寒気や息苦しさなどが、あれば申し出てください |  内服薬があります(治療 2 日目～治療 5 日目まで) |
| 行動 |  制限はありません |  点滴中は安静にお過ごしください  化学療法開始後のトイレの水は 2 回流しをしてください(48 時間) |  制限はありません |
| |  シャワー浴できます(週 3 回病棟によって日が異なります)  ・手洗い、うがいは 1 日に最低 8 回(起床時、毎食前後、就寝前)行ってください  ・口内炎、舌の荒れがひどくなるようでしたらお申し出ください 化学療法を行うと全身が乾燥しますので、全身に保湿剤を塗布してください(市販で保湿剤を購入できます) | | |
| 説明・指導 |  医師より(外来又は入院時) ・治療計画について ・化学療法について  看護師より ・入院生活について ・化学療法について ・点滴投与中の注意点について  薬剤師より ・持参薬確認 ・使用薬剤について | | |

*** 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

| 月日 | 月 日～ 月 日 | 月 日 | 月 日～ 月 日 | 月 日 | |
|-------|--|---------|---|-------------------------|--|
| 経過 | 治療 3～5 日目 | 治療 6 日目 | 治療 7～10 日目 | 退院日 | |
| 目標 | ○副作用症状が最小限度で経過する ○感染、出血予防行動、貧血時の注意行動ができる ○治療の流れや注意点が理解できる | | | ○感染、出血予防行動、貧血時の注意行動ができる | |
| 検査 |  適宜 血液検査 | | | | |
| 食事 |          | | | 朝食後退院 | |
| 処置・観察 | | | | 退院時リストバンドを外します | |
| 点滴・内服 |  内服薬があります (治療 2 日目～5 日目まで) | |  白血球が 1000/ μ L 以下の場合、G-CSF 製剤を注射します | | |
| 行動 |  制限はありません  シャワー浴できます (週 3 回病棟によって日が異なります)  ・手洗い、うがいは 1 日に最低 8 回(起床時、毎食前後、就寝前)行ってください  ・口内炎、舌の荒れがひどくなるようでしたらお申し出ください 化学療法を行うと全身が乾燥しますので、全身に保湿剤を塗布してください (市販で保湿剤を購入できます) | | | | |
| 説明・指導 | | |  医師より ・退院後の治療計画、療養上の留意点について  看護師より ・貧血時の注意点 ・出血予防について  看護師より ・退院後の療養生活について (退院療養計画書をお渡しします) ・次回入院の申込手続きについて ・PICC 挿入中の方は、自宅での入浴方法、次回受診時の採血・処置方法について | | |