
















説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)





















様へ

月日	月 日	月 日	月 日
経過	治療前日 (入院日)		治療1日目
目標	○心身共に安定した状態で治療を迎えることができる ○治療の流れや注意点が理解できる		○副作用症状が最小限度で経過する ○感染、出血予防行動、貧血時の注意行動ができる ○治療の流れや注意点が理解できる
検査	 身長、体重測定  適宜、血液検査、尿検査、心電図、胸部レントゲン実施		 適宜 血液検査
食事	朝食は自宅	 	     
処置・観察	入院時リストバンドを装着します(退院日まで装着します)		点滴前に留置針を挿入します 点滴が終了しても針は残しておきます (PICC 挿入されている方は、PICC から点滴します)
 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります			
点滴・内服	 持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください	 点滴前に内服薬があります  以下の点滴を行います(約4時間) 1) 制吐剤 2) エンドキサン 3) 生理食塩液 (2と同時滴下) 4) ドキソルピシン (2と同時滴下) 5) 生理食塩液 (2と同時滴下) 6) 点滴を1本 7) リツキシマブ 8) 生理食塩液 ※寒気や息苦しさなどがあれば、申し出てください	 内服薬があります(治療2日目～5日目まで)  以下の点滴を行います(約2時間) 1) 生理食塩液 2) ポライビー 3) 生理食塩液 ※寒気や息苦しさなどがあれば、申し出てください
行動	 制限はありません		 点滴中は安静にお過ごしください  化学療法開始後のトイレの水は2回流しをしてください(48時間)
	 シャワー浴できます(週3回病棟によって日が異なります)  ・手洗い、うがいは1日に最低8回(起床時、毎食前後、就寝前)行ってください  ・口内炎、舌の荒れがひどくなるようでしたらお申し出ください 化学療法を行うと全身が乾燥しますので、全身に保湿剤を塗布してください(市販で保湿剤を購入できます)		
説明・指導	 医師より(外来又は入院時) ・治療計画について ・化学療法について  看護師より ・入院生活について ・化学療法について ・点滴投与中の注意点について  薬剤師より ・持参薬確認 ・使用薬剤について		

*** 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日～ 月 日	月 日	月 日～ 月 日	月 日
経過	治療 3～5 日目	治療 6 日目	治療 7～10 日目	治療 11 日目 (退院日)
目標	○副作用症状が最小限度で経過する ○感染、出血予防行動、貧血時の注意行動ができる ○治療の流れや注意点が理解できる			○感染、出血予防行動、貧血時の注意行動ができる
検査	 適宜 血液検査			
食事	        			朝食後退院
処置・観察	点滴の針を抜針します		退院時リストバンドを外します	
 状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります				
点滴・内服	 内服薬があります (治療 2 日目～5 日目まで)		 白血球が 1000/ μL 以下の場合、G- CSF 製剤を注射しま す	
行動	 制限はありません  シャワー浴できます (週 3 回病棟によって日が異なります)  ・手洗い、うがいは 1 日に最低 8 回(起床時、毎食前後、就寝前)行ってください  ・口内炎、舌の荒れがひどくなるようでしたらお申し出ください 化学療法を行うと全身が乾燥しますので、全身に保湿剤を塗布してください (市販で保湿剤を購入できます)			
説明・指導	 看護師より ・貧血時の注意点 ・出血予防について		 医師より ・退院後の治療計画、療養上の留意点について  看護師より ・退院後の療養生活について (退院療養計画書をお渡しします) ・PICC 挿入中の方は、自宅での入浴方法、次回受診時の採血・処置方法について	