

FOLFIRI2+ベクティビックスを受けられる

様へ

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
経過	入院当日	2日目	3日目	4日目	退院日
標目	○心身共に安定した状態で治療が受けられる	○副作用の出現がない ○心身共に安定した状態で治療が受けられる			○副作用の出現がない
検査	身長と体重を測定します				
食事	食事の変更を希望される方は 早めにお知らせください				
	朝食は 自宅で				
処置・観察	リストバンドを装着します (退院日まで装着します)	9時30分頃に点滴(ポート)の針を さします 点滴の針を入れている箇所の観察をします	点滴の針を入れている箇所の観察をします	点滴の針を入れている箇所の観察をします 点滴が終了したら針を抜きます	退院時にリストバンドを外します
	状況に合わせて、体温・脈拍・血圧・酸素飽和度を測ります				
注射・内服	持参薬、お薬手帳を看護師に お渡しください	10時頃から以下の点滴を行います (約4時間) 1) 制吐剤 2) 生理食塩液 3) ベクティビックス 4) 生理食塩液 5) レボホリナート 6) イリノテカン(5と同時滴下) 7) フルオロウラシル	トレフェューザーポンプに変更し、 フルオロウラシルを投与 (約46時間)		
	行動	運動制限はありません	シャワーは可能です (週3回、病棟毎で日が異なります)	必要時、リハビリ科の診察が あります	
説明	医師より説明(外来又は入院時) ・治療計画について ・化学療法について	看護師より説明 ・点滴投与中の注意点について		医師より説明 ・退院後の治療計画、療養上の留意 について	看護師より説明 ・次回受診日時等について
	薬剤師より説明 ・持参薬確認 ・使用薬剤について			看護師より説明 ・退院後の療法生活について (退院療養計画書をお渡しします)	

* 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

08-251-3

2024.1.29 版

京都第一赤十字病院