



様へ

説明医師

説明看護師(外来)

看護師(病棟)

月日	月 日	月 日	月 日
経過	入院日	2日目	3日目
目標	<input type="checkbox"/> 確実に内服することができる <input type="checkbox"/> 不安を伝えることができる <input type="checkbox"/> 安全に療養することができる <input type="checkbox"/> 全身状態が安定して内服を続けることができる <input type="checkbox"/> 安心、安全に検査、治療を受けることができる		
検査	 心臓超音波検査 ※心電図は外来にて実施済		
食事	 制限はありません 通常通りの授乳・食事でかまいません 		
処置・観察	リストバンドを装着します (退院日まで装着します) 心電図モニターを装着します (稀に血糖値が低下し心臓の動きが悪くなるため)		
	 内服前と1時間後、2時間後に 体温・脈拍・血圧・呼吸数・ 酸素飽和度・血糖を測定します		 内服前と1時間後、時間後に 体温・脈拍・血圧・呼吸数・ 酸素飽和度・血糖を測定します
点滴・内服	 持参薬、お薬手帳を看護師にお渡しください  ヘマンジオルシロップを内服時間にお渡しします 看護師が内服の介助を行います 2日毎に増量します  1日2回、内服があります 内服の間隔は9時間以上あけてください 哺乳不良時、または嘔吐時は内服せずに看護師にお知らせください 副作用(血糖値の低下、脈が遅くなる、血圧が下がる)が出現した際は、減量、もしくは 内服を中止することがあります		
	制限はありません  沐浴、またはシャワー浴できます 		
説明	 医師より説明 ・入院治療計画について  看護師より説明 ・入院生活について  薬剤師より説明 ・持参薬確認 ・ヘマンジオルシロップの 内服について		
<p style="background-color: yellow;">※お子様から離れられる時は、必ずベッド柵を最上段まで上げ、転倒・転落事故にご注意ください</p>			

*** 入院に際して、この用紙を必ずお持ちください**

* 入院時に栄養状態を評価して栄養管理計画を立てます。定期的に栄養状態の再評価を行い計画を見直します。

* この表はおよその経過をお知らせしたものです。種々の都合により、予定通りではないこともあります。

月日	月 日	月 日	月 日
経過	4 日目	5 日目	6 日目 (退院日)
目標	副作用の出現がなく、内服増量できる 不安を伝えることができる		副作用なく退院できる
検査			 ・血液検査  ・心臓超音波検査(必要時)  ・心電図
食事	 制限はありません 通常通りの授乳・食事でかまいません 		
処置・観察		 内服前と1時間後、2時間後に 体温・脈拍・血圧・呼吸数・ 酸素飽和度・血糖を測定します	 内服前と1時間後、2時間後に 体温・脈拍・血圧・呼吸数・ 酸素飽和度・血糖を測定します 退院時にリストバンドを 外します
点滴・内服	 1日2回、内服があります 内服の間隔は9時間以上あげてください 哺乳不良時、または嘔吐時は内服せずに 看護師にお知らせください 副作用(血糖値の低下、脈が遅くなる、血圧が下がる)が 出現した際は、減量、もしくは内服を中止することがあります		 保護者の方に管理をお願い します
行動	制限はありません  沐浴、またはシャワー浴できます 		
説明			 医師より説明 ・退院後の 治療予定について  看護師より説明 ・退院後の療養について
<p>※お子様から離れられる時は、必ずベッド柵を最上段まで上げ、転倒・転落事故にご注意ください</p>			